



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان
بیمارستان آموزشی درمانی شهید رحیمی

مننژیت



شناسنامه ی بروشور آموزشی

عنوان	مننژیت
تهیه و تنظیم	منصوره شیراوند
سمت	کارشناس پرستاری
تایید کننده و نظارت	کارگروه آموزش به بیمار
سال بازنگری	1405
ناظر کیفی	
دکتر حمیدرضا شرکت العباسیه	

واحد آموزش به بیمار و ارتقاء سلامت همگانی

- * همه افراد باید آموزش مناسب برای استفاده از وسایل شخصی ببینند. و در هنگام صرف غذا از وسایل شخصی خود استفاده کنند.
- * به هیچ وجه از حوله و وسایل حمام یکدیگر به خصوص فرد مشکوک به بیماری استفاده نکنند.

منبع:

پرستاری داخلی جراحی برونر - سودارث ۲۰۱۰/ جلد ۱۰/
مغزو اعصاب/سوزان سی. اسملتزر /
احمدعلی اسدی نوقابی-شیوا سادات بصام پور /انتشارات
اندیشه رفیع

شماره تلفن بیمارستان: ۳۳۳۳۳۶۱۴۲-۸

داخلی بخش اطفال ۲۵۹۹

آموزش همگانی: ۳۳۳۳۸۱۵۶

وب سایت : rahimi.Lums.ac.ir



عوارض مننژیت


در صورتی که این بیماری به درستی تشخیص داده نشود عوارضی به دنبال خواهد داشت. از دست دادن بینایی، شنوایی، اختلالات رفتاری، اختلال در گفتار و گاهی فلج برخی از اعضای بدن را به دنبال خواهد داشت.

پیشگیری از مننژیت

* به طور معمول رایج ترین روش برای پیشگیری از مننژیت استفاده به موقع از واکسن می باشد.

* بهتر است به افرادی که در تماس با فرد مبتلا به مننژیت بوده اند آنتی بیوتیک مناسب داده شود.

* اما مناسب ترین روش پیشگیری رعایت بهداشت فردی توسط هر شخص می باشد.



مننژیت

- * مننژیت التهاب پرده ای است که در اطراف مغز و نخاع قرار گرفته است .
- * مننژیت به علت عفونت ویروسی یا باکتریایی ایجاد می شود .
- * مننژیت به انواع عفونی و غیر عفونی تقسیم می شود .
- * در مننژیت غیر عفونی علت ویروسی است.
- * هموفیلوس آنفلوانزا یکی از علل رایج مننژیت در اطفال است.
- * بروز مننژیت بیشتر در محیط های شلوغ و پرجمعیت نظیر خوابگاه دانشجویان و مقر نظامیان دیده می شود.
- * اگرچه عفونت در تمام سال اتفاق می افتد اما حداکثر شیوع در زمستان و اوایل بهار است .

عواملی که خطر مننژیت باکتریال را می افزاید

شامل:

- * مصرف تنباکو و عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی است.
- * افرادی که دچار نقص ایمنی هستند نیز در معرض خطر ابتلا به مننژیت باکتریال هستند.

تظاهرات بالینی

- * سردرد و تب: تب به صورتی که تمایل به بالا رفتن در طی مراحل مختلف بیماری دارد دیده می شود. سردرد عموماً دائم یا ضربان دار و بسیار شدید است .
- * سفتی گردن
- * در صورتی که بیمار به پشت دراز کشیده و پایش روی شکم خم شود پا نمی تواند به طور کامل باز شود.
- * وقتی گردن بیمار خم شود زانو و مفصل ران نیز خم می شوند.

* حساسیت بسیار شدید به نور

* راش

* نقص در حافظه و تشخیص موقعیت

* تظاهرات رفتاری

* خواب آلودگی و کما



درمان بیماری

پس از انجام آزمایش های لازم توسط پزشک و تشخیص نوع مننژیت در صورتی که مننژیت باکتریایی باشد درمان با آنتی بیوتیک آغاز می شود. در نوع ویروسی مننژیت بیماری بعد از دو هفته به طور خود به خود درمان می شود.