



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان
بیمارستان آموزشی درمانی شهید رحیمی

آشنایی با داروی ایفوسنامید



شناسنامه ی بروشور آموزشی

عنوان	آشنایی با داروی ایفوسنامید
تهیه و تنظیم	فاطمه باباهادی
سمت	کارشناس پرستاری- کارشناسی ارشد
تایید کننده و نظارت	فیزیولوژی پزشکی کارگروه آموزش به بیمار
سال بازنگری	1405
ناظر کیفی	دکتر یحیی بهاروند ایران نیا
دکتر یحیی بهاروند	رئیس هیأت مدیره آموزش به بیمار

واحد آموزش به بیمار و ارتقاء سلامت همگانی

توجهات ویژه:

- * میزان مایعات را به ۳ لیتر در روز برسانید . با تجویز فراوان مایعات در روز به همراه داروی مسنا و عدم تزریق دارو موقع خواب (به دلیل کاهش دفعات دفع ادرار) میتوان از بروز سمیت مثانه و سیستیت هموراژیک (خون ریزی مثانه)پیشگیری کرد .
- * از مصرف دارو به هنگام خواب خودداری شود زیرا کاهش دفع ادرار در طول شب ممکن است احتمال بروز التهاب خون ریزی دهنده مثانه را افزایش دهد .
- * بیمار باید هر ۲ساعت در روز و ۲بار در شب ادرار کند
- * در مبتلایان به عیب کار کلیه با احتیاط تجویز شود .

منبع :داروهای ژنریک

شماره تلفن بیمارستان :۳۳۳۳۶۱۴۲-۸

بخش انکولوژی:۲۶۷۶-۲۵۴۴

آموزش همگانی:۳۳۳۳۸۱۵۶

وب سایت : rahimi.Lums.ac.ir



* از مسواک نرم استفاده کنید .


* همزمان با داروی ایفوسفاماید از مصرف آسپرین ، NSAIDs، و ایبوپروفن استفاده نکنید زیرا احتما خون ریزی و جو دارد .

* طی درمان روش های ضد بارداری به کاربید.

* از تماس با افراد مبتلا به عفونت و توقف در اماکن شلوغ اجتناب ورزید.

* قبل از تزریق و درطول درمان یا در صورت نیاز شمارش کامل سلول های خونی (CBC)و آزمون های عملکرد کلیه و کبد انجام شود .

* مصرف دارو درآبله مرغان و زونا ممنوعیت دارد.



موارد مصرف :

- * سرطان بیضه، ریه، سینه، تخمدان، لنفوم هوچکین و غیره‌وچکین
- * موارد منع مصرف: حساسیت مفرط به دارو، زنان بارداروشیرده وابتلا به سرکوب شدید مغز استخوان
- * احتیاط: نارسایی کبدی و کلیوی /گرانولوسیتوپنی / متاستاز به استخوان /رادیوتراپی قبلی / انسداد جریان ادراری
- * مصرف در حاملگی :به دلیل خطرات جنینی مصرف دارو در دوران حاملگی ممنوع و طی مصرف از بارداری جلوگیری شود
- * مصرف در شیردهی :دارو در شیر مادر ترشح میشود لذا در طی مصرف ،شیردهی توصیه نمیشود.

شرایط نگهداری

دارو را بعد از گذشتن تاریخ انقضا روی جعبه مصرف نکنید. دارو را در درجه اتاق نگه دارید

عوارض جانبی:

هر دارویی باتوجه به مزایایی که دارد ممکن است یکسری عوارض جانبی نیز داشته باشد.

توجه شود که این عوارض کلی است و حتی ممکن است هیچکدام از آنها در شما ایجاد نشود.

* **سیستم عصبی:** لتارژی / کما / تشنج /

گیجی /اختلال جهت یابی

* **سیستم گوارشی:** تهوع و استفراغ

* **سیستم ادراری:** سوزش ادرار / تکرر ادرار /

خون ریزی مثانه (سیستیت هموراژیک :مهم ترین عارضه)

* **سیستم خونی:** کاهش گلبول های سفید

خون /کاهش گلبول قرمز و کاهش پلاکت

* **پوست:** ریزش مو

* **کبدی:** اختلال کارکرد کبدی و افزایش آنزیم

های کبدی

* **عفونت**

توجه داشته باشید که هریک از موارد زیر را به

پزشک مربوطه گزارش کنید:

* گلودرد /تورم غدد لنفاوی /احساس ناخوشی و تب ،این موارد میتوانند دلالت بر عفونت ثانویه داشته باشند.

* یرقان (زردی) پوست ،صلبیه ،ادرار تیره ،مدفوع بی رنگ ،خارش پوست ،درد شکمی ،تب و اسهال را گزارش کنید .

* طی درمان خود و اطرافیان از انجام واکسیناسیون اجتناب ورزند .

* مو در حین درمان احتمالا ریزش پیدا میکند در این صورت میتوان از کلاه گیس استفاده کرد .با توقف درمان رویش مو مجددا آغاز خواهد شد .موی جدید از نظر رنگ و ضخامت متفاوت خواهد بود .

* گزارش علایم کم خونی و آنمی شامل :خستگی بیش از حد /سردرد /کوتاهی تنفس / غش / تحریک پذیری

* حفرات بدن و مخاط از نظر خون ریزی و کبودی چک شود .هر نوع خون ریزی را گزارش کنید و از مصرف تیغ و دهانشویه های تجاری اجتناب کنید .