



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

بیمارستان آموزشی درمانی شهید رحیمی

آشنایی با داروی ریتوکسی ماب



شناسنامه ی بروشور آموزشی

عنوان	داروی ریتوکسی ماب
تهیه و تنظیم	مهرنوش کناری
سمت	کارشناس پرستاری
تایید کننده و نظارت	کارگروه آموزش به بیمار
سال بازنگری	1405
ناظر کیفی	
دکتر یحیی بهاروند	

واحد آموزش به بیمار و ارتقاء سلامت همگانی

شرایط مناسب برای نگه داری ریتوکسی ماب

چیست؟

دارو در دمای ۲-۸ درجه سانتی گراد در یخچال نگهداری شود.

شماره تلفن بیمارستان: ۳۳۳۳۶۱۴۲-۸

بخش انکولوژی: ۲۶۷۶-۲۵۴۴

آموزش همگانی: ۳۳۳۳۸۱۵۶

وب سایت: rahimi.Lums.ac.ir

مصرف در دوران شیردهی و بارداری چگونه است؟

* اگر باردار یا شیرده میباشید یا فکر میکنید ممکن است باردار شده و یا قصد بارداری دارید با پزشک خود مشورت کنید. شما باید در طول درمان با ریتوکسی ماب و تا ۱۲ ماه پس از اتمام درمان از روش های مطمین ضد بارداری استفاده نمایید و همچنین توصیه میشود در این مدت اقدام به شیردهی نوزاد نکنید

روش صحیح استفاده از ریتوکسی ماب چیست؟


* این دارو فقط با ارائه نسخه پزشک قابل تهیه میباشد و توسط پزشک متخصص انکولوژی و با تجربه در بیمارستان تزریق خواهد شد و در مدت تزریق دارو شما به طور مستقیم توسط یک پزشک یا پرستار تحت نظر خواهید بود.

* جهت درمان موثر همیشه دوره درمان توصیه شده توسط پزشک خود را تکمیل نمایید و دارو را بدون مشورت پزشک قطع نکنید.

* تعداد کل دفعات تزریق این دارو بستگی به نوع بیماری و چگونگی پاسخ شما به درمان دارد.

داروی ریتوکسی مَب

- * ریتوکسی مَب یک داروی انتی بادی مونوکلونال که علاوه بر بیماری لنفوم غیر هوچکین-لوسمی لنفوییدی مزمن-در بیماری آرتریت روماتوئید(روماتیسم) و گرانولوماتوز پِلی آنژیتیت و پِلی آنژیتیت میکروسکوپی(نوعی التهاب رگ های خونی) نیز استفاده میشود.
- * اگر به علتی تحت درمان با داروی ریتوکسی مَب هستید توصیه میشود قبل از تزریق دارو استامینوفن و آنتی هیستامین به عنوان پروفیلاکسی مصرف کنید و به اندازه کافی مایعات بنوشید.



عوارض جانبی مهمی که ممکن است در بیماران که این دارو را مصرف میکنند شامل موارد زیر می باشد:

- * مانند تمامی داروها این دارو نیز میتواند باعث ایجاد عوارض جانبی گردد. با این وجود عوارض جانبی در تمامی افراد دیده نمیشود. در بیماران که برای درمان روماتیسم با این دارو درمان میشوند واکنش های منفی کمتری را تجربه میکنند.



واکنش های مربوط به تزریق دارو:

- * واکنش های مربوط به تزریق دارو در اکثر بیماران در طول طول تزریق و دو ساعت بعد از تزریق اول رخ میدهد.
- * ریتوکسی مَب ممکن است منجر به برخی از واکنش های معمول مربوط به تزریق دارو مانند تب و لرز شود.
- * در صورت داشتن سردرد و استفراغ و گر گرفتگی، خستگی، مشکل در تنفس، تورم در زبان یا گلو و... پزشک یا پرستار خود را مطلع نمایید.
- * اگر مبتلا به بیماری قلبی هستید. این واکنش ها ممکن است شدیدتر باشند. در این شرایط پزشک سرعت تزریق داروی شما کم و یا تزریق و یا تزریق دارو را قطع میکند و یا دارو هایی مثل انتی هیستامین را تجویز میکند.
- * زمانی که این عوارض از بین رفته و یا بهبود یابند، تزریق دارو را میتوان ادامه داد. بروز عوارض مربوط به تزریق به طور کلی به میزان قابل ملاحظه ای در تزریق های بعدی کاهش می یابد.

