



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

بیمارستان آموزشی درمانی شهید رحیمی

آشنایی با داروی سیس پلاتین



شناسنامه ی بروشور آموزشی

عنوان	آشنایی با داروی سیپلاتین
تهیه و تنظیم	شکوفه شهسواری، شهرام احمدی
سمت	کارشناس پرستاری- کارشناسی ارشد
تایید کننده و نظارت	فیزیولوژی پزشکی کارگروه آموزش به بیمار
سال تولید	1405
ناظر کیفی	
دکتر یحیی بهاروند	

واحد آموزش به بیمار و ارتقاء سلامت همگانی

توجه داشته باشید که:

- * تا زمانی که بیمار تحت درمان با داروی سیس پلاتین میباشد فرد نباید با واکسن ویروس زنده ی ضعیف شده واکسینه شوند.
- * در صورت احساس سوزش، درد یا تورم در اطراف محل تزریق به پرستار خود اطلاع دهید.
- * این دارو به نور حساس می باشد و بهتر است زمان تزریق از کاور ضد نور استفاده شود.
- * تا حد امکان بعد از مصرف این دارو از قرار گرفتن در معرض نور خورشید دوری کنید.
- * بهتر است بیمار روزانه سه لیتر آب بنوشد.
- * دارو را در محیط بسته، خشک، دور از دسترس اطفال و نور نگهداری کنید.

شماره تلفن بیمارستان: ۰۸۳۳۳۳۶۱۴۲

بخش انکولوژی: ۰۲۶۷۶-۲۵۴۴

آموزش همگانی: ۰۳۳۳۳۸۱۵۶

وب سایت : rahimi.lums.ac.ir

واکنش آلرژیک:

- * ممکن است که از دقایق اول تزریق سرم ایجاد شود و علائم آن شامل: ورم صورت، تنگی نفس و یا افت فشارخون در بیمار ایجاد شود.
- * توجه! در صورت داشتن علائم فوق بلافاصله دارو باید قطع شود و به کارشناس پرستاری اطلاع داده شود.

مواردی که مصرف این دارو را برای بیمار منع میکند:

- * اگر بیمار به این دارو یا سایر داروهای دسته پلاتین (کربوپلاتین و اگزالی پلاتین) حساسیت دارد.
- * اگر بیمار در دوران شیردهی و بارداری می باشد
- * بیمارانی که از واکسن های زنده ضعیف شده مثل: فلج اطفال خوراکی، سرخجه ، سرخک، اوریون، تب زرد استفاده می کنند.

آشنایی با داروی سیس پلاتین

* سیس پلاتین یک داروی ضدسرطان و سرکوب کننده ی سیستم ایمنی می باشد که برای درمان انواع مختلف سرطان بکار میرود.

عوارض جانبی مهمی که ممکن است در بیمارانی که این دارو را مصرف میکنند شامل موارد زیر می باشد:

آسیب کلیوی:

* این عارضه میتواند با ایجاد اختلال الکترولیت بخصوص کاهش کلسیم خود را نشان دهد برای جبران این عارضه توصیه می شود از لبنیات شیر، ماست، پنیر، کشک که دارای میزان مناسبی از کلسیم هستند استفاده کنید.

* احتمال ایجاد آسیب کلیوی نیز وجود دارد که بیمار برای مقابله با این عارضه بهتر است که بخوبی هیدراته شود بیمار حداقل سه لیتر مایعات در روز مصرف کند هیدراته کردن بیمار باید در روزهای بعد از تزریق هم ادامه داشته باشد مخصوصا اگر بیمار حالت تهوع و استفراغ داشته باشد.

اختلال شنوایی:

اختلال شنوایی که خود را بصورت کاهش شنوایی و وزوز گوش نشان میدهد.

اختلال در فاکتورهای خونی:

اختلال در فاکتورهای خونی که خود را بصورت کاهش گلبول سفید خون، کاهش گلبول قرمز خون و کاهش پلاکت نشان میدهد.

کاهش گلبول سفید خون بیمار را در معرض خطر عفونت قرار می دهد بهتر است که تا حد امکان بیمار در مکان های شلوغ رفت و آمد نداشته باشد، بهداشت فردی را رعایت فرمایند، از ماسک استفاده شود و از افراد مبتلا به سرماخوردگی دوری شود.



اختلال گوارشی:

اختلال گوارشی که خود را بصورت حالت تهوع و گاهی استفراغ نشان میدهد.

این عارضه تقریبا یک تا چهار ساعت بعد از شروع دارو تقریبا در اکثر بیماران ایجاد می شود. برای کاهش تهوع بهتر است از داروهای ضدتهوع که پزشک شما تجویز می کنند استفاده شود، قبل از تزریق این دارو غذای کم حجم (سبک) و پرکالری مصرف شود، در زمانهایی که اشتها دارید غذا میل کنید و غذای خود را در تعداد وعده های زیاد و در حجم کم میل فرمائید و مایعات کافی در طول روز بنوشید.

