




دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

بیمارستان آموزشی درمانی شهید رحیمی

کله سیستگتومی



شناسنامه ی بروشور آموزشی

عنوان	کله سیستگتومی
تهیه و تنظیم	فرشته بیرانوند
سمت	کارشناس پرستاری
تایید کننده و نظارت	کارگروه آموزش به بیمار
سال تولید	1405

ناظر کیفی
دکتر مهدی زرگرانی

واحد آموزش به بیمار و ارتقاء سلامت همگانی

برداشتن کیسه صفرا به روش لاپاروسکوپی

در روش لاپاروسکوپی، جراح چهار برش در شکم ایجاد می کند از طریق یکی از برشها دوربین فیلم برداری کوچکی وارد شکم می شود جراح در اتاق عمل مانیتور را نگاه می کند و به وسیله آن برشهای دیگری در شکم می دهد و کیسه صفرا را بر می دارد سپس از مجرای صفراوی شما تصویر برداری می شود رادیولوژی اختلال مجرای صفراوی را نشان می دهد تا اگر جراح سنگ کیسه صفرا و یا مشکلات دیگری در مجرای صفراوی پیدا کند آنها را درمان می کند. شکاف بخیه زده می شود و شما به اتاقتان برده می شوید لاپاروسکوپی کیسه صفرا یک الی ۲ ساعت طول می کشد .

لاپاروسکوپی کیسه صفرا برای همه مناسب نیست ، در برخی موارد جراح شما ممکن است با روش لاپاروسکوپی شروع کند ، ولی ممکن است به دلیل وجود زخمهای قبلی یک برش بزرگتر ایجاد کند.

منابع :

پرستاری داخلی -جراحی برونر سوداژ

شماره تلفن بیمارستان : ۳۳۳۳۶۱۴۲-۸

جراحی زنان: ۲۲۱۵ جراحی مردان: ۲۲۷۷


آموزش همگانی: ۳۳۳۳۸۱۵۶

وب سایت : rahimi.Lums.ac.ir

برداشتن کیسه صفرا به روش سنتی (باز):

در جراحی باز جراح ۶ اینچ (۱۵ سانتیمتر) درروی شکم در زیر دنده سمت راست برش ایجاد می کند. عضلات و بافتها کشیده می شود تا کبد و کیسه صفرا دیده شود. سپس جراح کیسه صفرا را بر می دارد، شکاف ها بخیه زده می شود. عمل جراحی کیسه صفراوی باز ۱ الی ۲ ساعت طول می کشد . سپس شما را برای استراحت به اتاقتان می برند، تا اثر داروهای بیهوشی به تدریج از بین برود. مدت زمان بهبودی به وضعیت شما بستگی دارد:

روش لاپاروسکوپی: افرادی که تحت این نوع عمل قرار می گیرند معمولا در همان روز عمل اجازه مرخصی دارند. گاهی اوقات هم یک شب بستری لازم است. به طور کلی زمانی که بتوانید بدون درد بخورید و بیاشامید یا بدون کمک راه بروید مرخص خواهید شد. بهبودی کامل حدود یک هفته زمان نیاز دارد.



کوله سیستکتومی:

کوله سیستکتومی عمل جراحی برای برداشتن کیسه صفرا است. کوله سیستکتومی درمان بیماریهای کیسه صفرا شامل سنگ های صفراوی است، کوله سیستیت (التهاب یا عفونت کیسه صفرا)، و دیسکینزی صفراوی (توانایی کاهش از کیسه صفرا برای بیرون راندن صفرا). در حدود ۵۰۰،۰۰۰ آمریکایی هر سال تحت درمان کوله سیستکتومی قرار میگیرند

کوله سیستکتومی عمل جراحی برداشتن کیسه صفرا است. کیسه صفرا عضوی گلابی شکل درست زیر کبد در سمت راست بالای شکم است. در این کیسه، صفرا (مایع هضمی که توسط کبد تولید می شود) ذخیره و جمع آوری می شود.

کوله سیستکتومی زمانی که شما درد ناشی از سنگ کیسه صفرا که انسداد ایجاد کرده است را داشته باشید، لازم است. برداشتن کیسه صفرا یک جراحی رایج است و عوارض کمی دارد. در بیشتر موارد شما می توانید همان روز که کیسه صفرا را برداشته اید، به خانه بروید.

تعریف:

برداشتن کیسه صفرا برای درمان سنگهای صفرا و عوارض آنها استفاده می شود. پزشک ممکن است برداشتن کیسه صفرا را توصیه کند در صورتی که :

- ۱) سنگهای متعدد در کیسه صفرا وجود داشته باشد. (کوله لیتاسیس)
- ۲) سنگ در مجرای صفرا باشد.
- ۳) التهاب کیسه صفرا (کوله سیستیت)
- ۴) التهاب لوزالمعده (پانکراتیت)

عوارض برداشتن کیسه صفرا:

۱. نشت صفرا
۲. خونریزی
۳. لخته شدن خون
۴. مرگ
۵. مشکلات قلبی
۶. عفونت
۷. صدمه به مجرای صفراوی، کبد، روده کوچک
۸. التهاب لوزالمعده
۹. ذات الریه

خطرات فوق بستگی به وضعیت جسمانی شما دارد.

کوله سیستکتومی به روش لاپاروسکوپی

در طول عمر برداشتن کیسه صفرا با استفاده از بیهوشی عمومی انجام می شود بنابراین در طی عمل شما هوشیار نخواهید بود داروهای بیهوشی از طریق تزریق در بازو داده می شود. هنگامی که دارو اثر کرد، تیم پزشکی یک لوله پایین گلوی شما قرار می دهند تا به شما کمک کند نفس بکشید. جراح ممکن است از دو روش برای برداشتن کیسه صفرا استفاده کند:

۱) لاپاروسکوپی

۲) عمل باز

اغلب با قراردادن یک دوربین فیلم برداری کوچک و ابزار مخصوص جراحی از طریق چهار برش کوچک به داخل شکم انجام می شود تا داخل شکم دیده شود و کیسه صفرا برداشته شود. پزشکان به این روش لاپاروسکوپی می گویند.

در برخی موارد ممکن است یک برش بزرگ داده شود تا کیسه صفرا برداشته شود که به آن "برداشتن کیسه صفرای باز" می گویند.

