



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان


بیمارستان آموزشی درمانی شهید رحیمی

استامینوفن



شناسنامه ی بروشور آموزشی

عنوان	استامینوفن
تهیه و تنظیم	زینب دلفانی
سمت	کارشناس پرستاری
تایید کننده و نظارت	کارگروه آموزش به بیمار
سال بازنگری	1405
ناظر کیفی	
دکتر خدیجه کاظمی	



واحد آموزش به بیمار و ارتقاء سلامت همگانی

* در صورتی که فرم مایع استامینوفن استفاده مینمایید، مقدار مصرف در هر نوبت را دقیقاً طبق تجویز پزشک یا دارو ساز با پیمانه، سرنگ یا قطره چکان مخصوص اندازه گیری نمایید.



* مصرف استامینوفن می تواند منجر به خطا در جواب آزمایشات بالینی شود، لذا پیش از انجام آزمایش خون یا ادرار و سایر موارد، پزشک ویا مسئول آزمایشگاه را از مصرف این دارو مطلع کنید.

شماره تلفن بیمارستان: ۳۳۳۳۶۱۴۲-۸

داخلی مردان: ۲۴۷۴ - داخلی زنان: ۲۴۹۳

آموزش همگانی: ۳۳۳۳۸۱۵۶

وب سایت: rahimi.Lums.ac.ir



نحوه ی مصرف شیاف استامینوفن

* دست های خود را قبل و پس از استعمال شیاف بشویید.


* در صورتی که شیاف نرم شده است، پیش از مصرف به مدت ۱۵ دقیقه در یخچال قرار دهید.

* شیاف را از پوشش خود خارج نمایید و با کمی آب سرد مرطوب نمایید. سپس به یک پهلوی دراز کشیده و شیاف را در جهت مناسب با کمی فشار وارد مقعد نمایید.



توصیه ها

* در صورتی که تب بیمار بالا تر از ۴۰ درجه سانتی گراد باشد یا همراه علائمی مانند اسهال، استفراغ، گلودرد، سردرد شدید و ادامه دار میباشد، مراجعه به پزشک الزامی است و تنها کاهش تب با داروهای ضد تب، کفایت نمیکند. لذا از مصرف استامینوفن بیش از ۲ روز یا برای کودکان زیر ۳ سال بدون نظر پزشک خودداری نمایید.



گروه دارویی-درمانی

* ضد درد

* ضد تب

اشکال دارویی:

قرص جویدنی ۸۰ میلی گرم

قطره کودکان: ۱۰۰ میلی گرم / میلی لیتر

شربت خوراکی: ۱۲۰ میلی گرم / ۵ میلی لیتر

شیاف کودکان: ۱۲۵ میلی گرم

موارد احتیاط:

* افرادی که بیماری شدید کلیوی و کبدی دارند.

* افرادی که دچار آنمی یا کم خونی هستند.

* افرادی که اعتیاد مزمن به الکل دارند.

* افرادی که دچار سوتغذیه هستند.

* بارداری و شیر دهی

* خود درمانی بیش از پنج روز در کودکان

* افرادی که عفونت ویروسی دارند.

موارد منع مصرف

افرادی که سابقه حساسیت شدید دارند.

عوارض جانبی:

هر دارو ممکن است سبب بروز عوارض ناخواسته بشود. در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک معالج مشورت نمایید:

* تغییرات مغزی، ضعف

* راش، کهیر، خارش

* زخم های درمانی

* تهوع، استفراغ، اسهال، درد شکمی

* کم خونی، ادرار خونی یا درد ناک

* انهدام شدید کبدی (در دوز های سمی)

تداخلات دارویی:

* مصرف همزمان با آنتی اسیدها (ضد نفخ ها) موجب

تاخیر در جذب دارو می شود.

* مصرف فنوباربیتال و ایزو نیازید باعث اثرات سمی

استامینوفن را کاهش می دهد

* مصرف همزمان با هر گونه ماده غذایی ممکن است

موجب تاخیر در جذب دارو شود.

همه ی شما میدانید که نحوه ی تجویز دارو در کودکان باید بر اساس وزن کودک باشد.

یک روش بسیار ساده برتی محاسبه ی میزان استامینوفن مصرفی در کودکان :

* در زمان استفاده از قطره برای کاهش تب در

کودکان هر ۶ ساعت دو برابر وزن کودک

* اگر کودک سن بالاتری دارد و قطره جواب گو

نمی باشد، شربت مناسب تر میباشد.

* در صورت استفاده از شربت استامینوفن هر ۶

ساعت نصف وزن کودک بر اساس سی سی

شربت داده شود .

* (هر قاشق غذا خوری ۵ سی سی حجم دارد)

* در صورت استفراغ کودک و عدم تحمل خوراکی

استفاده از شیاف مناسب تر میباشد.

* نحوه ی محاسبه شیاف استامینوفن در کودکان

به صورت هر ۶ ساعت به ازای هر ده کیلو از

وزن کودک یک شیاف کامل برای کودک

استفاده کنید. مثلا برای کودک ۱۵ کیلویی باید

۱/۵ شیاف هر ۶ ساعت استفاده شود (منظور

شیاف ۱۲۵ میلی گرمی میباشد).