



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان


بیمارستان آموزشی درمانی شهید رحیمی

قرص ریواروکسابان



شناسنامه ی بروشور آموزشی

عنوان	قرص ریواروکسابان
تهیه و تنظیم	فایزه کمالی
سمت	کارشناس پرستاری
تایید کننده و نظارت	کارگروه آموزش به بیمار
سال بازنگری	1405
ناظر کیفی	



واحد آموزش به بیمار و ارتقاء سلامت همگانی

* استفاده از الکل در طی استفاده از این دارو، خطر خونریزی معده را افزایش می دهد.

* اگر دچار جراحت شدید، مخصوصا اگر دچار ضربه به سر شدید، سریعاً با پزشک خود تماس بگیرید.

* اگر باردار هستید یا قصد بارداری دارید به پزشک خود اطلاع دهید.

* در صورت همزمان این دارو با قرص آسپرین با این دارو خطر خونریزی در فرد افزایش می یابد.

منابع:

درسنامه جامع پرستاری مولفین احمد علی اسدی
نوقابی و گروه اساتید دانشگاه

سایت پزشکان برومند

شماره تلفن بیمارستان: ۸-۳۳۳۳۶۱۴۲

داخلی مردان: ۲۴۷۴ - داخلی زنان: ۲۴۹۳

آموزش همگانی: ۳۳۳۳۸۱۵۶

وب سایت: rahimi.Lums.ac.ir



احتیاطات مصرف:

* این دارو در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه، نارسایی کبد یا مبتلایان به بیماری های کبدی با احتیاط فراوان باید مصرف شود.

* این دارو باید حداقل ۲۴ ساعت قبل از جراحی قطع گردد. در صورت بی حسی اپی دورال یا نخاعی نیز ممکن است خونریزی و فلج موقتی ایجاد شود.


* مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی با احتیاط و طبق نظر پزشک باید صورت گیرد.

* در صورت ابتلا به هر نوع بیماری قبل از مصرف این دارو با پزشک مشورت کنید.

* دارو را هر روز در زمان های مشخص مصرف کنید.

* با توجه به دفع کلیوی بخشی از این دارو و کاهش عملکرد کلیه ها در سالمندان، می بایست کلیرانس کلیوی در سالمندان حتی با وجود طبیعی بودن کراتینین سم، محاسبه شود و در صورت افت کلیرانس کراتینین به کمتر از ۵۰ میلی لیتر بر دقیقه بر اساس بروشور دارو، کاهش دوز صورت گیرد.

* برای بیماران فیبریلاسیون دهلیزی در کلیرانس کراتینین کمتر از ۱۵ و برای سایر اندیکاسیون ها در کلیرانس کراتینین کمتر از ۳۰ ممنوعیت مصرف دارد.



قرص ریواروکسابان

یک داروی ضد لخته بوده که نوعی پروتئین انعقادی خاصی را مسدود می کند و از تشکیل لخته های خونی جلوگیری کرده و در نتیجه خطر سکته قلبی و مغزی کاهش می دهد. انعقاد خون در رگ ها از دلایل عمده سکته های قلبی و مغزی می باشد. به همین دلیل است که پزشکان معمولا برای افرادی که سابقه سکته داشته اند مصرف داروهای ضد انعقاد و خون همچون قرص وارفارین و قرص ریواروکسابان را پیشنهاد می دهند. از این دارو همچنین در افراد مبتلا فیبریلاسیون دهلیزی استفاده شده و به کاهش خطر سکته مغزی ناشی از لخته خون کمک می کند.

نام های تجاری:

در ایران این دارو با نام های تجاری آکسابین، زالربان، زارلتو، کلاتور موجود می باشد.

اشکال دارویی:

این دارو به صورت قرص های ۱۰، ۱۵، ۲۰ میلی گرمی موجود است.

ریواروکسابان پس از مصرف به سرعت جذب می گردد.

موارد مصرف:

برای جلوگیری از تشکیل لخته خون استفاده می شود. لخته ای که در اثر بعضی از بی نظمی های قلبی یا بعد از جراحی زانو یا لگن به وجود می آید. همچنین برای درمان لخته ی خون مانند ترومبوز وریدهای عمقی یا آمبولی ریوی و جلوگیری از تشکیل مجدد لخته استفاده می شود.

تداخلات دارویی:

تداخلات دارویی ممکن است عملکرد دارو را تغییر دهد یا خطر به وجود آمدن عوارض جانبی خطرناک آن را افزایش دهد. بعضی از داروهایی که می توانند با این دارو تداخل داشته باشند شامل: کتوکونازول، فنی توئین، کاربامازپین، ریفامپین، فلوکستین می باشند

مقدار و نحوه مصرف:

میزان دقیق مصرف این دارو باید توسط پزشک تعیین گردد. اگر از این دارو برای جلوگیری از سکته ی مغزی یا جلوگیری از ایجاد لخته بعد از جراحی زانو یا لگن استفاده می کنید معمولا مقدار مصرف روزی یک بار می باشد. اگر برای جلوگیری از سکته مغزی یا جلوگیری از ایجاد لخته ی خون که ممکن است در اثر بی نظمی قلب به وجود می آید استفاده می کنید مقدار مصرف روزی یک بار همراه با وعده شبانه می باشد. قرص های ۱۵ میلی گرمی باید همراه با غذا مصرف شوند.

عوارض:

اگر برای درمان لخته خون استفاده می کنید مقدار مصرفی روزی دوبار در سه هفته ی اول و بعد از آن روزی یک بار می باشد. مراقب باشید از که از دستور پزشکتان پیروی کنید. مقدار مصرف دارو را افزایش ندهید و بدون توصیه پزشک دارو را قطع نکنید.

شایعترین عارضه ریواروکسابان خونریزی می باشد. کبودی و خونریزی های خفیف در مواردی ممکن است اتفاق بیافتد. در صورتی که این علائم تشدید شد باید به پزشک مراجعه شود. در صورت تاثیر این دارو بر روند انعقاد خون موجب خونریزی در فرد می شود. در صورت مشاهده خونریزی شدید از قبیل درد و ورم غیر طبیعی، احساس خارش، خونریزی دائم و موقت بینی، خونریزی طولانی لثه، قاعدگی های دردناک و طولانی، سیاه یا صورتی بودن رنگ ادرار، استفراغ خونی، سردرد شدید، سرگیجه، احساس ضعف و خستگی، مدفوع خونی و سیاه و مشکل در بلع غذا باید به پزشک مراجعه کرد.