



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

بیمارستان آموزشی درمانی شهید رحیمی

قرص نیترو گلیسرین



شناسنامه ی بروشور آموزشی

عنوان	قرص نیترو گلیسرین
تهیه و تنظیم	سمیه رضایی-الهام منصوری
سمت	کارشناس پرستاری
تایید کننده و نظارت	کارگروه آموزش به بیمار
سال بازنگری	1405
ناظر کیفی	مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی فوق تخصص قلب و عروق بورد تخصصی بیماریهای داخلی 65752

واحد آموزش به بیمار و ارتقاء سلامت همگانی

منبع:

داروهای ژنریک ایران- نشر حکیم هیدجی- چاپ اول
برونر و سودارث داخلی جراحی قلب و عروق- نشر
جامعه نگر چاپ چهارم

شماره تلفن بیمارستان: ۳۳۳۳۶۱۴۲-۸

داخلی مردان: ۲۴۷۴- داخلی زنان: ۲۴۹۳

آموزش همگانی: ۳۳۳۳۸۱۵۶

وب سایت: rahimi.Lums.ac.ir

* سردرد عارضه معمولی نیترات هاست که با ادامه درمان کاهش میابد و در صورت تداوم یا تشدید سردرد مراجعه به پزشک ضروری است.

* در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو اگر تا نوبت بعدی دو یا ۶ ساعت فاصله باشد از مصرف آن باید خودداری نمود.

مقدار مصرف:

* قرص یا کپسول پیوسته رهش در بزرگسالان: بعنوان آنژین صدری ۰.۴ یا ۰.۶ میلی گرم با توجه به دستور پزشک در بازه ی زمانی مناسب مصرف میشود.

* قرص زیر زبانی در بزرگسالان بعنوان ضد آنژین صدری ۰.۴ میلی گرم مصرف میشود که در صورت نیاز برای رفع حملات آنژین هر ۵ دقیقه تکرار میشود.

قرص نیتروگلیسرین

یکی از داروهای پر مصرف شایع در بیماران آنژین قلبی قرص نیتروگلیسرین بویژه از نوع زیر زبانی میباشد. ممکن است مصرف داروی تجربه جدیدی برای شما بوده و شما در به یاد داشتن مصرف آن مشکلات زیادی داشته باشید. مصرف دارو مطابق دستور پزشک بسیار مهم است.

این دارو برای پیشگیری و درمان

- * آنژین صدری
- * درمان نارسایی بطن چپ
- * کنترل فشار خون می باشد .

عوارض جانبی:

- * سردرد کوبنده
- * سرگیجه
- * کمی فشار خون وضعیتی

تداخل دارویی

مصرف همزمان نیتروگلیسرین با فراورده های حاوی الکل و داروهای پایین آورنده فشارخون یا داروهای گشادکننده عروق ممکن است کمی فشار خون ناشی از اثرات نیتروگلیسرین را تشدید کند.

نکات قابل توصیه:

- * قرص معمولی و پیوسته رهش نیتروگلیسرین باید همراه بایک لیوان آب و معده خالی مصرف کرد.
- * هنگام استفاده از قرص زیر زبانی تا زمانیکه قرص حل نشده باشد از خوردن یا نوشیدن باید خودداری شود.
- * هنگام استفاده از پماد نیتروگلیسرین پیش از مصرف پوست باید تمیز شود و در هر بار مصرف پماد باید بر روی سطح بدون مو مالیده و گسترده شود ، بعد از گسترده شدن دارو را نباید روی پوست ماساژ داد.

* با بروز اولین علائم حمله آنژین باید نشست و از قرص زیر زبانی استفاده نمود و در صورت بروز سرگیجه یا از حال رفتن باید احتیاط کرد ، اثر قرص ها معمولاً طی ۵ دقیقه ظاهر میشود

* قرص معمولی پیوسته رهش همچنین فراورده های موضعی نیتروگلیسرین از بروز حمله آنژین صدری جلوگیری می نماید و سبب رفع درد ناشی از حمله نمیشود.

* قرص های زیر زبانی نیتروگلیسرین نباید در معرض هوا قرار گیرند زیرا ممکن است اثر آنها کاهش یابد

* به هنگام برخاستن از حالت خوابیده یا نشسته باید احتیاط نمود و بهنگام ایستادن به مدت طولانی یا فعالیت بدنی و همچنین در آب و هوای گرم باید احتیاط نمود.