



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان


بیمارستان آموزشی درمانی شهید رحیمی

پنتوپرازول



شناسنامه ی پرورشور آموزشی

عنوان	داروی پنتوپرازول
تهیه و تنظیم	وحیده خدایی چگنی
سمت	کارشناس پرستاری
تایید کننده و نظارت	کارگروه آموزش به بیمار
سال بازنگری	1405
ناظر کیفی	
دکتر عبدالرضا	
ماهرویی	



واحد آموزش به بیمار و ارتقاء سلامت همگانی

آموزش به بیمار و خانواده :

- * به بیمار بیاموزید که مصرف دارو دقیقاً طبق تجویز پزشک در یک ساعت مشخص و در طول روز باید باشد.
- * مصرف همزمان آنتی اسید با پنتوپرازول هیچ تاثیری در روند جذب دارو نخواهد داشت .
- * در دمای اتاق نگه داری شود .
- * این دارو را خرد نکنید و یا نجوید و آن را به صورت کامل مصرف کنید .

منابع :

- داروهای ژنریک ایران ، تالیف دکتر رامین خدام

شماره تلفن بیمارستان : ۸-۳۳۳۳۶۱۴۲

بخش آندوسکوپی: ۲۰۷۴

آموزش همگانی: ۳۳۳۳۸۱۵۶

وب سایت : rahimi.Lums.ac.ir



شایع ترین عوارض جانبی

سردرد ، دل درد، تهوع ، استفراغ ، اسهال ، نفخ

مهم ترین عوارض جانبی:


افزایش قند خون ، واکنش های حساسیتی ، سکتة قلبی ، آسیب کبدی ، آنژین قلبی

سایر عوارض :

اضطراب ، سرگیجه ، بی خوابی ، درد قفسه سینه ، سینوزیت ، تکرر ادرار، دردهای مفصلی ، افزایش ترشح بزاق ، وز وز گوش ، حساسیت به نور ، بی اشتهایی

مصرف دارو در بارداری و شیر دهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیر دهی باید با احتیاط صورت بگیرد .



پنتوپرازول

* داروی پنتوپرازول یک مهار کننده پمپ پروتون است به مقدار اسید تولید شده در معده را کاهش می دهد. از این دارو برای درمان بیماری التهاب و فرسایش مری (آسیب مری در اثر اسید معده) استفاده می شود.

* یکی از عوامل محافظت کننده در بدن اسید معده است که علاوه بر کمک به هضم غذا باعث از بین رفتن میکروب ها و ویروس هایی می شود که از راه گوارش وارد بدن می شود.

* قرص پنتوپرازول با کاهش اسید معده مقاومت بدن را کاهش می دهد و در صورت مصرف این دارو باید مراقبت بیشتری در خصوص مواد غذایی مصرفی داشته باشید.

توصیه های دارویی :

* مصرف پنتوپرازول با نلفیناویر و آتازاناویر ممنوع است و در صورت استفاده از این دارو حتما به پزشک اطلاع دهید.

* پنتوپرازول همچنین در درمان زخم معده، رفلکس معده و نیز برای کاهش عوارض گوارش سایر دارو ها مصرف می شود.

* بهتر است دارو یک ساعت قبل از صبحانه مصرف شود.

* در صورت پوکی استخوان ، کمبود منیزیم خون بیماری کبدی قبل از مصرف با پزشک خود مشورت کنید.

* مصرف طولانی مدت پنتوپرازول خطر شکستگی استخوان مخصوصا در افراد مسن افزایش می دهد.

اشکال دارویی پنتوپرازول:

* کپسول : ۲۰ و ۴۰ میلی گرم

* قرص : ۲۰ و ۴۰ میلی گرم

* تزریق : ۴۰ میلی گرم در هر ویال (آمپول پنتوپرازول)

