



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان


بیمارستان آموزشی درمانی شهید رحیمی

تب مالت (بروسلوز)



شناسنامه ی بروشور آموزشی

عنوان	تب مالت (بروسلوز)
تهیه و تنظیم	مهسا بازگیر
سمت	کارشناس پرستاری
تایید کننده و نظارت	کارگروه آموزش به بیمار
سال بازنگری	1405
ناظر کیفی	
دکتر تبسم زواری	



واحد آموزش به بیمار و ارتقاء سلامت همگانی

- * مصرف مواد لبنی پاستوریزه عدم مصرف مواد لبنی خام
- * پنیر محلی باید به مدت سه ماه در آب نمک نگهداری شود و سپس استفاده شود .



- * در درجات پایین باکتری بروسلا برای مثال در خاک تا ۱۰ هفته در کودها تا ۲.۵ سال و در لاشه های منجمد شده برای سالها باقی می ماند .
- * ارتقای سطح دانش مناطق روستایی و دامداران و کارکنان

منبع:

راهنمای کشوری مبارزه با بروسلوز نویسندگان دکتر محمد زینلی، شیرزادی، رسولی ۱۳۹۱

شماره تلفن بیمارستان: ۳۳۳۳۶۱۴۲-۸

داخلی ۲۱۶۱

آموزش همگانی: ۳۳۳۳۸۱۵۶

وب سایت : rahimi.Lums.ac.ir



عوامل موثر در کاهش تب مالت

- * حرارت جوش دمای ۱۰۰ درجه (استریلیزاسیون) به مدت یک دقیقه
- * پاستوریزاسیون ۳۸ درجه سانتیگراد به مدت ۱۵ دقیقه
- * در مناطق روستایی جوشیدن شیر به مدت ۵ دقیقه توصیه می شود .
- * رعایت نکات بهداشتی در کشتارگاه ها و دامداری ها و آزمایشگاه ها
- * واکسیناسیون دام ها
- * شناسایی سریع حیوانات بیمار و درمان



تب مالت

بروسلوز یک بیماری عفونی شایع و مشترک بین انسان و دام است و شیوع آن در انسان نشان دهنده گسترش بیماری در حیوانات است.

بطور معمول این وضعیت در انسان به علت تماس مستقیم با حیوانات آلوده یا فرآورده‌های آنها، تماس با حیوانات دچار سقط جنین و مصرف شیر آلوده مشاهده می شود.

راه های سرایت بیماری :

* تماس مستقیم با حیوانات آلوده از راه ملتحمه چشم خراش و جراحات پوست با ترشحات مواد دفعی یا بافت های حیوانات آلوده یا اشیاء آغشته به ترشحات عفونی

* مصرف بافت ها یا مواد غذایی با مایعات حاوی باکتری بروسلا مانند شیر خام پنیر تازه، خامه و سرشیر



* انتقال تنفسی از طریق استنشاق ذرات عفونی معلق در آغل، اصطبل و آزمایشگاه

علائم بیماری:

تأحد زیادی وابسته به نوع باکتری است ولی براساس شدت بیماری به اشکال حاد تحت حاد و مزمن و موضعی بروز پیدا می کند :

نوع حاد : در این شکل بیمار گرفتار لرز ناگهانی، درد عمومی بدن بخصوص **درد پشت** بوده و عرق شدید دارد. بیمار اشتهای خود را از دست داده و از ضعف و سستی شکایت دارد.



نوع تحت حاد: آغاز آن بی سروصدا است گاهی بدنبال مرحله تب دار حاد ایجاد می شود بیمار از ضعف و خستگی شدید شاکی است .

نوع مزمن : غالباً علائم بعد از یک دوره تب دار برای سالها باقی می ماند .

نوع موضعی: باکتری در اعضای مختلف بدن می تواند بیماری ایجاد کند شایع ترین اعضا شامل استخوان مفاصل سیستم اعصاب مرکزی قلب ریه و... است .

معیار تشخیص آزمایشگاهی:

* جداکردن عامل بیماری از بافت ها بوسیله کشت دو آزمایش 2ME و COOMBS WRIGHT

درمان:

معمولاً درمان با آنتی بیوتیک حداقل برای مدت ۸-۶ هفته می باشد.



* درمان خود را براساس دستور پزشک ادامه دهید. **درمان ناقص** یکی از عوامل در مزمن شدن بیماری می باشد.

* **زنان باردار** حتماً به پزشک خود از وضعیت بارداری اطلاع دهند .

