



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

بیمارستان آموزشی درمانی شهید رحیمی

مسمومیت با متادون



شناسنامه ی پرورشور آموزشی

عنوان	مسمومیت با متادون
تهیه و تنظیم	شیرین علی پور
سمت	کارشناس پرستاری
تایید کننده و نظارت	کارگروه آموزش به بیمار
سال تولید	۱۴۰۴
ناظر کیفی	

واحد آموزش به بیمار و ارتقاء سلامت همگانی

- همراه مداوم بر بالین بیمار حضور داشته باشد و علایمی مانند سیاه شدن لب ها ، بستر ناخن ها و پوست بیمار و همچنین علایمی همچون تنفس سخت ، خرو پف اطلاع داده شود .
- از اتصالات بیمار مانند آنژیوکت محافظت گردد که در صورت نیاز به اقدام اورژانسی اتلاف وقت صورت نگیرد .
- پوزیشن نیمه نشسته رعایت گردد و در صورت تشخیص پزشک و توصیه پرستار اکسیژن داشته باشید .

شماره تلفن بیمارستان: ۳۳۳۳۶۱۴۲-۸

آموزش همگانی: ۳۳۳۳۸۱۵۶

وب سایت : rahimi.Lums.ac.ir



نکات مهم :

- * از ریختن شربت متادون در شیشه نوشابه و نگهداری در یخچال و در دسترس اطفال گذاشتن آن به شدت خودداری کنید .
- * این نکته بسیار مهم است که فرد هنگام مراجعه به دندانپزشکی ، مصرف متادون را گزارش دهد تا داروهایی که موجب تأثیر و تداخل با متادون می شوند را تجویز ننمایید .
- * توصیه می شود در دوره ترک به هیچ وجه از الکل استفاده ننمایید حتی نوشیدنی های حاوی الکل نیز استفاده نگردد زیرا باعث مرگ می شود .

نکات مهم زمان بستری مسمومیت با متادون :

- ♦ از خوردن و آشامیدن تا زمان هوشیاری کامل و بلع کارآمد و مناسب و اخذ اجازه از پزشک خودداری نمایید .



مسمومیت با متادون

متادون چیست ؟

متادون در دسته ای از داروها قرار دارد که به عنوان اپیوئیدویک داروی ترک اعتیاد شناخته می شوند. این دارو در جنگ جهانی دوم توسط آلمان تولید شد و در آمریکا در ابتدا به عنوان ضددرد قوی برای دردهای بسیار شدید به کار برده شد. این دارو امروزه علاوه بر تسکین درد اغلب به عنوان بخشی از درمان وابستگی به مصرف هروئین یا سایر مواد مخدر استفاده می شود. متادون به فرم های دارویی خوراکی ، فراورده تزریقی ، پودر و محلول خوراکی در بازار دارویی ایران عرضه می شود .

علائم مصرف بیش از اندازه متادون چیست ؟

تغییر دوز دارو به صورت خودسرانه یا مصرف غیر قانونی متادون و مواد مخدر ممکن است موجب مسمومیت با دارو شود . علائم مصرف بیش از حد متادون به شرح ذیل است : در صورت مشاهده این علائم به سرعت به مراکز درمان مسمومیت مراجعه نمایید :

- ♦ گیجی و خفگی
- ♦ ضربان قلب کند
- ♦ خواب آلودگی شدید
- ♦ ضعف عضلانی
- ♦ پوست سرد و مرطوب
- ♦ کوچک شدن مردمک ها
- ♦ بیهوشی و کما
- ♦ تکلم سخت و بریده بریده
- ♦ تشنج
- ♦ سیاه شدن دور لب و پوست
- ♦ کاهش تنفس و اکسیژن رسانی
- ♦ مرگ

اقدامات لازم در هنگام مواجهه با فرد

مسموم شده با متادون و مواد مخدر :

۱. سریعاً باید با اورژانس تماس گرفته شود .
۲. بهتر است بیمار به سمت پهلو خوابانده شود تا از ورود ترشحات دهانی و معده ای به مجاری تنفسی جلوگیری شود .
۳. مهمترین اقدام زمانی که فرد دچار قطع تنفس شده است، دادن تنفس مصنوعی می باشد ، در صورتی که تنفس مصنوعی را بلد نیستید بهتر است با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کند ، در صورتی که بیمار فاقد نبض بود باید ماساژ قلبی را شروع کنید .
۴. پادزهر مسمومیت با متادون و مواد مخدر دارویی به نام نالوکسان است که تزریق آن در بیمارستان و توسط پرسنل درمانی صورت می گیرد .