




دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

بیمارستان آموزشی درمانی شهید رحیمی


خونریزی داخل مغزی



خونریزی مغزی

شناسنامه ی بروشور آموزشی

عنوان	خونریزی داخل مغزی
تهیه و تنظیم	فاطمه کاظمی نیا
سمت	کارشناس پرستاری
تایید کننده و نظارت	کارگروه آموزش به بیمار
سال بازنگری	1405
ناظر کیفی	
دکتر خدیجه کاظمی	



واحد آموزش به بیمار و ارتقاء سلامت همگانی

منابع: درسنامه پرستاری داخلی و جراحی مغز و اعصاب
ترجمه زهرا مشتاق ویراست ۱

شماره تلفن بیمارستان: ۸-۳۳۳۳۶۱۴۲

آموزش همگانی: ۳۳۳۳۸۱۵۶

داخلی مردان: ۲۴۷۴

داخلی زنان: ۲۴۹۳

داخلی جنرال: ۲۵۰۷

وب سایت: rahimi.Lums.ac.ir




اقدامات در مانی:

- ۱- دادن اکسیژن به بیمار
- ۲- دارو درمانی و استفاده از سرم مانیتول و سالین هیپرتونیک
- ۳- ایجاد سوراخ در جمجمه (کرانیو تومی) جهت پایین آوردن سریع فشار داخل مغز چون اگر فشار مغز بالا باشد خون رسانی مغز کاهش می یابد و هم چنین برداشتن لخته و کنترل خونریزی
- ۴- هیپرونتیلیسیون در بیماران اینتوبه
- ۵- کمای باربیتورات و هیپوترمی در موارد مقاوم به درمان
- ۶- داروهای سداتیو در بیماران اینتوبه که بیقرار می باشند

هشدارها:

- ۱- اطلاع به پزشک در صورت هر گونه تشنج و یا حرکات غیر عادی
- ۲- کنترل سطح هوشیاری بیمار و آگاهی او نسبت به زمان و مکان
- ۳- اطلاع در صورت بی قرار ی



خونریزی داخل مغزی :

سطح خارجی مغز و نخاع به وسیله پرده مننژ که شامل نرم شامه، عنكبوتیه و سخت شامه است پوشیده می شود در خونریزی داخل مغزی عروق خونی داخل مغز یا بین جمجمه و مغزپاره می شوند، جمع شدن خون بافت مغز را فشرده می کند. علائم خونریزی داخل مغزی ممکن است پس از وارد شدن ضربه به سر ایجاد شوند و یا ظاهر شدن علائم خونریزی به مرور زمان که فشار وارد شده به مغز افزایش یافته ایجاد شوند. بسته به اینکه خونریزی در کجای مغز اتفاق بیفتد به خونریزی سابدرال (خونریزی بین مغز و خارجی ترین لایه پوشاننده مغز میباشد) خونریزی اپیدورال (خونریزی بین جمجمه و خارجی ترین لایه پوشاننده مغز می باشد) یا اینکه خونریزی داخل بافت مغز می باشد. تقسیم می شوند.

علائم و نشانه ها :

- ۱- تغییر در سطح هو شیاری
- ۲- سردرد شدید
- ۳- تهوع و استفراغ
- ۴- تغییرات بینایی
- ۵- تشنج بدون داشتن سابقه
- ۶- افزایش فشار داخل مغزی که با سه علامت افزایش فشار خون ، کاهش نبض، اختلال تنفس مشخص می شود .

علل ایجاد خونریزی :

- ۱- فشار خون بالا
- ۲- ضربه به سر
- ۳- اختلالات انعقادی
- ۴- بد شکلی رگ ها

علل بروز سکته مغزی



تشخیص:

- ۱- سی تی اسکن
- ۲- ام آر ای
- ۳- آزمایش مغزی - نخاعی

عوارض:

ادم و فتق مغزی، کاهش خورسانی مغز، اختلال در تهویه و اکسیژن رسانی، به هم خوردن تعادل آب و الکترولیت ها و حملات تشنجی می باشد .