




دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

آندوسکوپی



شناسنامه ی پرورش آموزش

عنوان	آندوسکوپی
تهیه و تنظیم	صادق امیری کیا
سمت	کارشناس پرستاری
تایید کننده و نظارت	کارگروه آموزش به بیمار
سال بلزنگری	1405
ناظر کیفی	
دکتر عبدالرضا	
ماهرویی	



واحد آموزش به بیمار و ارتقاء سلامت همگانی

عوارض احتمالی آندوسکوپی:

این عوارض بسیار نادر هستند:

- * خونریزی از ناحیه نمونه برداری یا در محلی که پولیپ برداشته شده است
- * پارگی (سوراخ یا پارگی معده) که نیاز به جراحی پیدا میکند
- * برخی از بیماران ممکن است در واکنش به آرام بخش ها دچار عوارض قلبی و یا بیماری ریوی شوند.
- * اگر چه این عوارض بسیار نادر است ولی اگر شما دچار تب یا مشکل در بلع افزایش درد در گلو، قفسه سینه یا در شکم و خونریزی از جمله استفراغ یا مدفوع سیاه را به پزشک معالج اطلاع بدهید .

شماره تلفن بیمارستان: ۸-۳۳۳۳۶۱۴۲

آموزش همگانی: ۳۳۳۳۸۱۵۶

آندوسکوپی: ۲۰۷۴

وب سایت : rahimi.Lums.ac.ir



بعد از آندوسکوپی شما ممکن است به دلیل استفاده هوا در طول آندوسکوپی دچار نفخ شوید و بعد از آندوسکوپی می توانید غذا بخورید. مگر این که دکتر دستور بدهد فعلا چیزی نخورد. پزشک نتایج حاصل از این بررسی را به شما داده شود. باید همراه داشته باشید و رانندگی نکنید.



آندوسکوپی

آندوسکوپی اجازه می دهد پزشک مری، معده و اثنی عشر را بررسی کند .

چرا آندوسکوپی انجام می شود:

آندوسکوپی در ارزیابی علائم مداوم درد ناحیه بالا شکم، تهوع، استفراغ یا اشکال در بلع و خونریزی معده کمک میکند.

آندوسکوپی دقیقتر از فیلم های رادیولوژی و روش های دیگر التهاب زخم و سرطان مری معده و اثنی عشر است. و با نمونه گیری جهت تشخیص بافت های بدخیم یا خوش خیم و هلیکوباکتر پیلوری که میکروبی است که باعث زخم معده می شود. پزشک از این روش استفاده می کند

آماده سازی جهت آندوسکوپی:

معده خالی اجازه میدهد تا بهترین و امن ترین بررسی انجام شود .

پس شما باید حدود ۶ ساعت قبل از انجام آزمایش غذا نخورید .

آندوسکوپی در درمان بیماریهای نیز استفاده می شود . به عنوان مثال

- * برای گشاد کردن منطقه تنگ شده
- * برداشتن پولیپ (غده معمولاً خوش خیم)
- * درمان خونریزی

مصرف دارو قبل از آندوسکوپی:

* بیشترین داروها را می توان قبل از آندوسکوپی استفاده کرد . اما برخی داروها با گرفتن نمونه تداخل پیدا می کند.

* درمورد داروهای مصرفی به ویژه آسپرین یا داروهای ضد پلاکتی، داروهای ورم مفاصل ، ضد انعقاد ها (هپارین، وارفارین) کلوپیدوگرل، انسولین یا محصولات آهن به دکتر خود اطلاع دهید، همچنین لازم به ذکر است هر گونه آلرژی به داروها را اطلاع دهید.